

Avertissements agricoles

DLP 21-5-85517793

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

Bulletin n° 5 du 15 mai 1985

AVERTISSEMENT DESTINE AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS

(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes)
(les GVA, les CIVAM et les Coopératives)

- * Les observations ont porté sur 46 champs de blé dur.
23 champs de blé tendre.
8 champs d'orge.

Le bilan général fait apparaître une très nette progression de la Rouille Brune qui est le problème dominant du Lauragais et du Razès; plus particulièrement sur les parcelles qui étaient déjà atteintes et dans toutes les situations précoces du Razès et du Sillon. La quasi totalité des champs du stade 9 au stade 10-2, est à traiter.

- Les situations plus tardives arrivent au seuil dans la Piège, notamment sur variétés sensibles de BD et de BT.
- Les secteurs moins précoces, en particulier de la Montagne Noire, ne sont pas concernés par les maladies, sauf un peu de Septoriose et d'Oïdium à la base. Dans ces cas là, attendre avant de traiter.
- Ailleurs, si vous n'avez pas encore protégé vos cultures proches de l'épiaison ou en cours d'épiaison (stade 10 à 10-2), et qui présentent de la Rouille Brune sur les trois derniers étages foliaires ou un des trois, TRAITEZ IMPERATIVEMENT, c'est la stade ultime pour sauvegarder le potentiel de vos champs et valoriser votre intervention.

Pour les semis plus tardifs, les variétés plus résistantes, ou les situations moins précoces, le seuil d'intervention est : Présence de R.B. sur la F3.

Les parcelles ayant reçues une protection, il y a 15 jours ou 3 semaines, doivent être observées, et en cas de nouvelle contamination, doivent être à nouveau protégées, même si le niveau de rouille paraît faible (rouille active); de nouvelles contaminations sont en cours et une nouvelle explosion de la maladie devrait se produire prochainement.

La Septoriose et l'Oïdium ne progressent pas.

.../...

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42



* Sur cultures épiées : Utilisez une des solutions suivantes :

- . IMPACT T 2,7 litres/Ha.
- . BAYFIDAN D 4 litres + 0,5 l/Ha.
- . TILT SP 2 litres/Ha.

* Avant épiaison :

- . IMPACT R 1,3 litre/Ha.
- . CORVET CM 4 Kgs/Ha.
- . TILT C 1 litre/Ha.
- . BAYFIDAN D 4 litres + 0,5 l/Ha. (emballage associatif)

POIS PROTEAGINEUX :

- . Attaque de Mildiou généralisée.
- . Anthracnose stationnaire.
- . Botrytis stationnaire.
- . Pucerons présents dans toutes les cultures et en progression (nombreuses coccinelles - quelques individus parasités).

Traitez impérativement à réception du présent avis à l'aide de DITHANE M45 à raison de 2,5 Kg par Ha.

- . Le relèvement prochain des températures doit stopper l'évolution du MILDIOU.

NOUS AVONS DECOUVERT UN FOYER DE ROUILLE JAUNE A VILLEPINTE

SURVEILLEZ VOS CULTURES.

=====

(Tirage du 15 Mai 1985 - 1 600 exemplaires)

(c) Bulletin technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER 1985.

